

# Avis de vaccination

**Important : Gardez ce formulaire avec le dossier de vaccination de l'élève ou tout autre document portant sur sa santé.**

_____ a été vacciné _____ avec le ou les vaccins mentionnés ci-dessous :		Bras
<input type="checkbox"/>	Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, <i>haemophilus influenza</i> de type b	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	<i>Haemophilus influenza</i> de type b	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Hépatite A	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Hépatite B	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Papillomavirus humain (9 types de VPH)	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Rougeole, oreillons et rubéole	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Rougeole, oreillons, rubéole et varicelle	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Méningocoque de groupe B	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Antiméningococcique conjugué de type C	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Antiméningococcique conjugué groupes A, C, Y, W-135	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Antipneumococcique conjugué 13	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Polio	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Tétanos, diphtérie et coqueluche	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Tétanos, diphtérie, coqueluche et polio	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Varicelle	Gauche Droit
<input type="checkbox"/>	Autre :	

## Soins après la vaccination :

- Les enfants peuvent utiliser normalement leur bras après la vaccination.
- Des effets secondaires peuvent se manifester tels que douleurs, fièvre, rougeur ou une enflure au point d'injection pouvant durer 1 à 2 jours après la vaccination. Utilisez des compresses froides pour soulager l'enflure au point d'injection.
- Pour plus de précisions sur les effets secondaires, consultez les fiches de renseignement accompagnant le formulaire de consentement ou consultez le site [www.saskatchewan.ca/bonjour](http://www.saskatchewan.ca/bonjour).
- Pour de plus amples renseignements sur les programmes de vaccination, communiquez avec la ligne Info-santé au 811 ou consultez le site [www.saskatchewan.ca/bonjour](http://www.saskatchewan.ca/bonjour).
- **Signalez tout effet secondaire à votre infirmière de la santé publique, à votre médecin ou à une infirmière praticienne.**

De l'acétaminophène (Tylenol® et Tempra®) peut être administré contre la fièvre ou la douleur. Il ne faut PAS administrer d'AAS (Aspirin®) aux personnes de moins de 18 ans afin d'éviter toute apparition du syndrome de Reye.