

Avis de vaccination

Important : Gardez ce formulaire avec le dossier de vaccination de l'élève ou tout autre document portant sur sa santé.

| _____ a été vacciné _____ avec le ou les vaccins mentionnés ci-dessous : | | Bras |
|---|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, <i>haemophilus influenza</i> de type b | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | <i>Haemophilus influenza</i> de type b | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Hépatite A | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Hépatite B | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Papillomavirus humain (9 types de VPH) | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Rougeole, oreillons et rubéole | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Rougeole, oreillons, rubéole et varicelle | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Antiméningococcique de groupe B | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Antiméningococcique conjugué de groupe C | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Antiméningococcique conjugué de groupes A, C, Y, W-135 | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Antipneumococcique conjugué 13 (VCP-13) | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Polio | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Tétanos, diphtérie et coqueluche | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Tétanos, diphtérie, coqueluche et polio | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Varicelle | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | COVID-19 (préciser la marque : _____) | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Autre : | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Autre : | Gauche Droit |
| <input type="checkbox"/> | Autre : | Gauche Droit |

Soins après la vaccination :

- Les enfants peuvent utiliser normalement leur bras après la vaccination.
- Effets indésirables les plus courants : fièvre, rougeur et douleur temporaires au point d'injection. La fièvre et la sensation de fatigue sont généralement légères et ne durent qu'un jour ou deux. Utilisez des compresses froides pour soulager la rougeur ou l'enflure au point d'injection.
- Ne traiter la fièvre que si votre enfant ne se sent pas bien, s'il refuse de boire ou s'il a du mal à dormir.
- Pour plus de précisions sur les effets secondaires, consultez les fiches de renseignement accompagnant le formulaire de consentement ou consultez le site www.saskatchewan.ca/bonjour/.
- Pour de plus amples renseignements sur les programmes de vaccination, communiquez avec la ligne Info-santé au 811 ou consultez le site www.saskatchewan.ca/bonjour/.
- **Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmière de la santé publique, à votre médecin ou à une infirmière praticienne.**

De l'acétaminophène (Tylenol® et Tempra®) peut être administré contre la fièvre ou la douleur. Il ne faut PAS administrer d'AAS (Aspirin®) aux personnes de moins de 18 ans afin d'éviter toute apparition du syndrome de Reye.