

# Test cutané de dépistage de la tuberculose

## Qu'est-ce que la tuberculose?

- La tuberculose est une infection causée par des bactéries qui se propagent lorsqu'une personne atteinte de tuberculose tousse, éternue ou a des contacts rapprochés (face à face) avec d'autres personnes.
- Les personnes dont les poumons sont infectés par les germes de la tuberculose peuvent répandre la maladie.
- Les bactéries tuberculeuses, qui se développent dans les poumons, peuvent causer des lésions permanentes.
- Parfois, les bactéries tuberculeuses affectent d'autres parties du corps telles que les glandes, les reins, les os et le cerveau.
- **La tuberculose est la principale cause de décès par maladie infectieuse dans le monde.**

## Qu'est-ce qu'une infection tuberculeuse?

- **Vous souffrez d'une infection tuberculeuse si vous avez inhalé des bactéries tuberculeuses qui ont pénétré dans vos poumons, mais qui ne se développent pas.**
- Vous ne vous sentirez pas malade et vous n'êtes pas contagieux.
- Après un certain temps, il est possible que les bactéries deviennent actives et que la tuberculose se développe.

## Qu'est-ce que la tuberculose?

- **On parle de tuberculose quand les bactéries tuberculeuses deviennent actives et se multiplient.**
- Vous pouvez ou non vous sentir malade, mais il est important de ne pas oublier que vous pouvez transmettre les germes tuberculeux à votre entourage.

## Les symptômes de la tuberculose comprennent :

- de la fièvre et des frissons;
- une toux chronique qui dure plus de quatre semaines et qui produit des crachats de sang;
- des sueurs nocturnes;
- une perte de poids;
- une perte d'appétit;
- de la fatigue.

**Pour en savoir plus, communiquez avec vos services de santé publique locaux, votre médecin, votre infirmière praticienne, InfoSanté en ligne ou composez le 811.**

## Qu'est-ce qu'un test cutané de dépistage de la tuberculose et pourquoi en ai-je besoin?

- TUBERSOL<sup>MD</sup> est indiqué pour aider au diagnostic de l'infection tuberculeuse (TB) chez les personnes présentant un risque accru de développer la maladie active.
- Le test cutané est un moyen de dépister les bactéries tuberculeuses dans votre organisme.
- Les germes de la tuberculose peuvent être présentes dans votre organisme sans que vous soyez malade.
- **Un test cutané ne constitue pas une immunisation à la tuberculose.**

## Qui ne devrait pas subir un test cutané à la tuberculose?

- Les personnes qui ont eu une réaction positive à un test cutané antérieur.
- Les personnes qui ont eu une réaction allergique à un ingrédient de TUBERSOL<sup>MD</sup>.
- Les personnes qui ont eu une réaction sévère (p. ex. nécrose, formation de cloques, choc anaphylactique ou ulcérations) à un test tuberculitique cutané antérieur.
- Les personnes atteintes d'une tuberculose active documentée ou ayant déjà été traitées pour l'infection tuberculeuse ou la tuberculose.
- Les personnes présentant des brûlures étendues ou un eczéma, en raison d'une plus grande probabilité d'effets indésirables ou de réactions graves.
- Les personnes qui ont reçu un vaccin vivant doivent attendre un mois avant de subir un test cutané à la tuberculose.
- **REMARQUE : Le fait d'avoir reçu le vaccin BCG ne constitue pas une contre-indication au test tuberculitique.**

## Où peut-on passer ce test?

- Vous pouvez passer un test de dépistage de la tuberculose en vous rendant à l'unité de services de santé de votre localité, ou en demandant à votre médecin de faire les démarches afin que vous passiez ce test.
- La clinique de tuberculose à Saskatoon ou à Regina offre aussi ce test.

## En quoi consiste le test cutané?

Il s'agit d'un test en deux étapes.

- Première étape : à l'aide d'une aiguille fine, on injecte sous la surface de la peau de l'avant-bras une substance anodine. On vous demandera d'attendre 15 minutes avant de quitter la clinique après l'administration du test à cause du risque très minime d'une réaction allergique. Une boursoufflure (« enflure ») temporaire pourrait apparaître au point où l'aiguille a été insérée. C'est une réaction normale. En cas de démangeaison au site de l'injection, **ne le grattez pas.**
- Deuxième étape : deux jours plus tard vous devez retourner à la clinique afin de mesurer la réaction au test. Lorsque le test est mesuré, le résultat indique un test cutané négatif ou positif.

## Que signifient les résultats du test?

- Un test cutané à la tuberculose négatif indique habituellement que les bactéries tuberculeuses ne sont pas présentes dans votre organisme. Si vous avez été exposé à une personne atteinte de tuberculose active, on pourrait vous demander de subir un nouveau test cutané après 6 à 12 semaines.
- Si votre test cutané est positif, on effectuera une radiographie pulmonaire pour voir si vos poumons sont atteints. Si la radiographie est anormale ou que vous vous sentez malade, on vous demandera de fournir un échantillon d'expectorations (crachats) aux fins d'analyse.
- Vous devrez subir des tests supplémentaires afin d'établir laquelle des trois catégories ci-dessous s'applique à vous.

### 1. Une vaccination antérieure contre la tuberculose.

Vous pourriez avoir reçu un vaccin antituberculeux appelé vaccin BCG quand vous étiez enfant. Il est alors peu probable que votre réaction au test cutané soit prononcée, vu que les effets de ce vaccin diminuent avec le temps.

### 2. Une infection tuberculeuse.

Les germes de la tuberculose sont présents dans votre organisme, mais ils **NE SONT PAS** actifs et ils ne vous rendent pas malade. À ce stade, vous n'êtes pas contagieux.

### 3. Tuberculose active.

Les germes de la tuberculose présents dans votre organisme sont actifs et se multiplient. Vous pourriez vous sentir malade. Si vous souffrez de tuberculose active, vous pouvez transmettre à d'autres les germes de la tuberculose.

## Existe-t-il un traitement pour la tuberculose?

- Les médicaments *pouvant* guérir la tuberculose sont entièrement gratuits. Si vous contractez la tuberculose, vous **devez** être soigné, *tant* pour vous-même *que* pour prévenir la transmission des germes de la tuberculose à votre famille et à vos amis.
- Le traitement consiste à prendre régulièrement plusieurs types de pilules pendant six à neuf mois. Durant cette période, vous subirez plusieurs radiographies des poumons et plusieurs analyses de vos expectorations (crachats) pour suivre l'évolution de votre progrès.

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration du test cutané de dépistage de la tuberculose à cause de la possibilité extrêmement rare d'une réaction allergique constituant un danger de mort nommée anaphylaxie. Ce genre de réaction peut comprendre de l'urticaire, des problèmes respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. **Si cela se produit après avoir quitté la clinique, composez le 9-1-1 ou le numéro d'appel des secours locaux.** Une telle réaction peut être soignée et se produit dans moins d'un cas sur un million de personnes ayant passé un test cutané de dépistage de la tuberculose.

## À qui devez-vous signaler toute réaction au vaccin?

- Signalez dès que possible toute réaction inattendue ou indésirable à votre infirmière de la santé publique, une infirmière praticienne ou à votre médecin.

### Communiquez avec une infirmière de la santé publique si :

- vous avez des questions ou des craintes concernant votre réaction ou la réaction de votre enfant à un vaccin;
- vous ou votre enfant avez dû aller chez le médecin, à l'hôpital ou dans un centre de soins de santé pour un symptôme pouvant être lié à la vaccination.

## Que contient la solution utilisée pour le test de dépistage de la tuberculose?

TUBERSOL<sup>MD</sup> contient un dérivé protéinique purifié de *Mycobacterium tuberculosis*, du phénol et du polysorbate 80.

## Consentement des mineurs matures (adolescents)

Il est recommandé que les parents/tuteurs discutent du consentement à la vaccination avec leurs enfants. Le consentement s'adresse en premier lieu aux parents ou aux tuteurs. Toutefois, en Saskatchewan, les adolescents de 13 à 17 ans capables de comprendre les avantages et les réactions possibles à chaque vaccin, ainsi que les risques de ne pas être vaccinés, peuvent légalement consentir ou refuser la vaccination en présentant un consentement éclairé, en tant que mineur mature, au fournisseur de soins de santé.

Les feuillets d'information sur les vaccinations offertes par la province se trouvent à l'adresse suivante :

[www.saskatchewan.ca/bonjour/](http://www.saskatchewan.ca/bonjour/).

Référence : Monographie du produit TUBERSOL<sup>MD</sup> (2022).