

# Calendrier régulier de vaccination

## Veillons à la sécurité et au maintien de la santé de la population de la Saskatchewan.

Ces vaccins sont offerts gratuitement par la santé publique et d'autres fournisseurs de soins de santé sélectionnés. Les vaccinations effectuées à temps, selon leur calendrier, vous offrent ainsi qu'à vos enfants, la meilleure protection contre bon nombre de maladies graves et contagieuses évitables par immunisation.

Calendrier régulier de vaccination des enfants	
Âge/Année scolaire	Abréviation et nom complet du vaccin
2 mois	<a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <a href="#">Pneu-C-13</a> (Antipneumococcique conjugué 13) <a href="#">Rot-5</a> (Antirovirus)
4 mois	<a href="#">DTaP-IPV-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <a href="#">Pneu-C-13</a> (Antipneumococcique conjugué 13) <a href="#">Rot-5</a> (Antirovirus)
6 mois	<a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <a href="#">Rot-5</a> (Antirovirus)
12 mois	<a href="#">RORV</a> (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle) <a href="#">Men-C-C</a> (Antiméningococcique conjugué de type C) <a href="#">Pneu-C-13</a> (Antipneumococcique conjugué 13) <a href="#">HA</a> (Hépatite A pour les enfants qui vivent dans les réserves et dans certaines collectivités du Nord)
18 mois	<a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <a href="#">RORV</a> (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle) <a href="#">HA</a> (Hépatite A pour les enfants qui vivent dans les réserves et dans certaines collectivités du Nord)
4 à 6 ans	<a href="#">DCaT-VPI</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé)
6 <sup>e</sup> année	<a href="#">L'hépatite B (HB)</a> <a href="#">Men-C-ACYW-135</a> (Antiméningococcique conjugué A, C, Y, W-135) <a href="#">VPH-9</a> (Papillomavirus humain - 9 types de VPH)
8 <sup>e</sup> année	<a href="#">dcaT</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos)
6 mois à 17 ans	<a href="#">Influenza</a> (recommandé tous les ans)
Calendrier de vaccination des adultes	
18 ans et plus	<a href="#">Influenza</a> (tous les ans) <a href="#">Td</a> (Tétanos et diphtérie) chaque 10 ans <a href="#">dcaT</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos) devrait remplacer une des doses du vaccin Td <a href="#">ROR</a> (Rougeole, oreillons, rubéole pour les personnes nées après le 1 <sup>er</sup> janvier 1970) <a href="#">VPI</a> (Poliovirus inactivé pour les adultes admissibles) <a href="#">Varicella</a> (pour les adultes admissibles)
65 ans et plus	<a href="#">Pneu-P-23</a> (Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque – dose unique à vie, dans la plupart des cas)
Personnes présentant certains facteurs de risque	
Certaines personnes sont admissibles à recevoir ces vaccins sans frais. Renseignez-vous auprès d'une infirmière de la santé publique.	<a href="#">Hépatite A</a> <a href="#">Hépatite B</a> <a href="#">Antiméningococcique conjugué A, C, Y, W-135</a> <a href="#">Méningococcie de groupe B</a> <a href="#">Antipneumococcique conjugué 13</a> <a href="#">Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque</a> <a href="#">dcaT</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos) dans tous les cas de grossesse afin de protéger le bébé de la coqueluche.